

***Cleoceris viminalis* (F., 1777) género y especie
nuevos para la Península Ibérica
(Lep. Noctuidae)**

POR

R. AGENJO.

En 1970 publiqué un trabajo titulado: "Seis géneros y veinte especies de *Noctuidae* nuevos para España" (*Graellsia*, t. XXV, páginas 119-140, láms. II-VI) que representó un notable incremento de nuestro censo nacional relativo a dicha familia.

Al estudiar ahora el material, todavía no acabado de preparar, recolectado de día o con luces durante la segunda decena de julio de 1963 en el Valle de Arán, provincia de Lérida, donde realicé provechosas excursiones, recorriéndolo ampliamente, he identificado una especie de *Noctuidae*, *Trifinae*, *Cuculliidi*, binomio nuevo para la Península Ibérica, del que cogí dos ♂♂ en Les, a 631 m., pueblo donde pernoctaba, cuyo Ayuntamiento es fronterizo con Francia, a la que se pasa por el puesto de Pont du Roi, en Hautes-Pyrénées. Se trata de la *Cleoceris viminalis*, que describió Fabricius el año 1777, en la página 284, número 542, de su "*Genera insectorum (cum Mantissa specierum nuper detectarum)*" de la siguiente manera: "*Noctua viminalis*, cristata, alis incumbetibus (deflexis) basi fusci; strigis undatus fulvis apice cinereis".

Uno de mis ♂♂ (fig. 1) presenta el andropigio (fig. 2) idéntico a los de otros individuos procedentes de Renania en Alemania y Stettin, que ahora pertenece a Polonia. El otro carece de abdomen, pero no creo equivocarme al considerarlo coespecífico con el anterior.

Casi todas las obras lepidopterológicas clásicas de fines del siglo pasado y primera mitad de éste han tratado a *viminalis* en el género *Bombycia* Sph., 1829, considerando a *Cleoceris* B., 1840, sinónimo del anterior. Así lo hicieron Staudinger y Rebel, 1901; Hampson, 1906; Lampert, 1907; Spuler, 1908; Warren in Seitz, 1910; Rebel in Berge's, 1910; Culot, 1909-1913; Klocker, 1913; Lhomme, 1924-1926, y Herbulot, 1948. En cambio, Hoffman, 1887 y 1893; Korb, 1893, y Joannis,

1901, prefirieron utilizar *Cleoceris*, que es el que en la actualidad prevalece, aunque en realidad está mucho menos popularizado.

El género debe situarse entre *Phorocera* Gn., 1850, que no estoy muy convencido haya sido correcto desglosarlo del más amplio *Metopoceras* Gn., 1850, para lo que no se tuvo en cuenta el estudio de los ginopigios de las especies de uno y otro, las cuales yo sí he examinado con meticulosidad hace muchos años, y *Episema* O., 1816, del que, por lo que se refiere a España, publiqué en 1936 una monografía bajo el título “Las *Episema trimacula* Schiff. y *ramburi* Zerny y sus diferentes formas (*Eos*, t. XII, páginas 11-41, láms. I-II, figs. 1-2), especies que ahora se conocen, respectivamente, como *glaucina* (Esp., 1789) y *grueneri* (B., 1832); el género también se denominó *Derthisa* Wlk., 1857, con asenso bastante unánime desde 1910, y así figura, por sugerencia de Boursin, en la página primera de la V entrega de mi “Catálogo ordenador de los lepidópteros de España” aparecida en 1947, pero después recobró el nombre que yo empleé en 1936. Lo digo a fin de colmar el frenesí crítico de algunos directivos de la revista *Shilap*, capaces de




Fig. 1.—♂ de *Cleoceris viminalis* (F.) de Les, Lérída. (Tamaño natural) (F. Cristóbal fot.).




Fig. 2.—Andropigio de *Cleoceris viminalis* (F.) de Les, Lérída. (×10) (R. Abad y M. A. Valle del.).

censurar el empleo de nominaciones científicas usuales en determinadas épocas, y que más tarde varían en virtud de la aplicación, más o menos correcta, de las “Reglas de Nomenclatura” —alteradas otra vez por el “Código Internacional de Nomenclatura Zoológica” de 1958— para recuperar con posterioridad su anterior validez, en el continuo tejer y destejer de esta materia.

El género es eurásico y probablemente holártico, y *viminalis* su especie-tipo.

Hasta ahora se sabía que esta falena colonizaba Europa central y

septentrional, Armenia, El Altai, Siberia y la cuenca del río Amur. En Italia es conocida, según Mariani (*Catalogo ragionato dei Lepidotteri d'Italia*, pág. 45, 1940-1941), de las regiones norteñas: Piamonte, Trentino y Alpi Marittime. Ha sido muchas veces citada de Francia central y meridional, pero pocas de los Pirineos, de donde Rondou, en la página 285 de su "*Catalogue*", publicada en 1933, sólo la indicó de Cauterets, Gèdre y Gavarnie, localidades ubicadas en el Departamento de Hautes-Pyrénées, aunque desde entonces haya podido recolectarse en otros sitios de dicha cadena montañosa.

Según la literatura, la oruga vive sobre sauce *Salix caprea* L. y otras especies de dicho género, encontrándose casi siempre en hojas situadas en la extremidad de las ramas, arrollando a las primeras para constituirse un refugio. Se la menciona de mayo y junio.

